


BRANCHIAL APPARATUS




'Branchialapparatet' er et område



Branchialapparatet (*'gællebue-apparatet'*) svarer til et område, der begrænses af en linie:

- * fra mundvigen
- * til øverste spids af ydre øre
- * derfra trækkes linien til processus mastoideus
- * og videre langs m. sternocleidomastoideus
- * til brystbenet.

Branchialapparatet – et område




De fleste strukturer indenfor dette område stammer fra branchialapparatet.

Det gælder både organer, skeletdele, muskler og kar.

Hvis man tænkte sig, at man skar det indkredsede område ud, så ville man have en tyk plade, hvis *forflade* ville bestå af hud på halsens forside og hvis *bagflade* ville bestå af svælgets forvæg.


Branchialapparatet



I dette område genfinder vi senere branchialbuerne og deres **skeletdele**:

- underkæben, der løber bueformet,
- tungebenet, der ligeledes løber bueformet,
- skjoldbrusken, og
- strubehovedet, der ligeledes er bueformet.

Udskæring af branchialapparatet



Her ses udskæringen af branchialapparatet foretaget på et tidspunkt under fosterudviklingen:

Den lille tegning forneden til venstre viser, hvor snittet lægges i fostret. Det ligger nogenlunde parallelt med panden.

Den midterste store tegning viser branchialapparatet fra indsiden. Den snitflade, man har fremkaldt ved skæringen, er skraveret.

Model af branchialapparatet forfra



Billedet her viser en model af branchialapparatet set forfra på et tidligt tidspunkt..




Som det fremgår, består branchialapparatet af buer.

Forsiden er beklædt med ektoderm, bagsiden eller indsiden er beklædt med endoderm.


Branchialbuerne udfyldes af **ectomesenkym**, celler der kommer fra crista neuralis

Ectomesenchym

- celler fra crista neuralis der vokser, invaderer og fylder brankialbuerne som det "fjerde kimlag"
- de er multipotentielle stamceller og kun få mesodermale celler findes tilbage i brankialbuerne




Udvikling af tandorganet



Tænder udvikler sig gennem nedvækst af epitel fra mundhulen.

Ectomesenkym - med *ectomesenkymale stamceller* - indgår i udviklingen af tandens dentin, pulpa og støtteapparatet.



Modellen fra bagsiden



Her vises modellen fra bagsiden. Området mellem de røde felter i højre og venstre side, viser indsiden af branchialapparatet, hvor man ser branchialbuerne adskilt af furer. De røde felter svarer til snitfladen.

På branchialapparatets indside, der som nævnt er beklædt med endoderm, udvikles vigtige organer, bl.a. tungen.

Begyndelse til udvikling af tungen



Dette billede viser den spæde begyndelse til udvikling af tungen. Det er de farvede områder. De svarer til knopper, der dannes på branchialapparatets indside. Og som det vises på det næste billede.

Udvikling af tungen




Her vokser knopperne sammen og danner en fremhæveling, der med lidt god vilje ligner begyndelsen til en tunge.

Udvikling af tungen



Her ser vi udviklingen på et lidt mere fremskredent stadium og tungeformen er nu blevet lidt tydeligere.

Skematiseret branchialapparat




Billedet viser her et stærkt skematiseret branchialapparat set bagfra. Det er skåret ud ligesom før.

Romertallene til venstre angiver, hvor snittene har ramt, samt numrene på de enkelte branchialbuer.

Arabertallene imellem buerne svarer til de ydre furer, for de **sorte tals** vedkommende, mens de indre furer er vist med **røde** tal.


Nogle buer vokser mere end andre



Fra at ligne et "ensartet vaskebræt" bliver branchialapparatet mere og mere uregelmæssigt..

Nogle buer vokser mere end andre, men princippet - med hensyn til furer og buer - er dog stadig bevaret.

Organer bliver udviklet fra de indre furer




Billedet viser, at der fra de indre furer dannes vigtige organer. Mest iøjnefaldende er **B**, som markerer begyndelsen til skjoldbruskkirtlen, der er det største organ, der udvikles fra branchialapparatets indside.

Furen med det røde **1**-tal bliver til det Eustachiske rør og trommehulen.

Forskellige kirtelorganer udvikler sig gennem nedvækst af epitel fra brankialfurerne.

Udvikling af skjoldbruskkirtlen




Her ser vi at skjoldbruskkirtlen **B** er udviklet videre. Samtidig begynder der at optræde en række småorganer i de øvrige indre furer.

De andre organer, er for det første mandlen, tonsilla palatina, der kommer ved det røde **2**-tal.

Endvidere biskjoldbruskkirtlerne,  der er vigtige, og brisselen .

- Biskjoldbruskkirtlerne svarer til de blå klatter ved det røde **3**-tal og **4**-tal, og brisselen svarer til den gule klat under det røde **3**-tal.


Udvikling af skjoldbruskkirtlen



Her er udviklingen gået videre, brisselen ● er vokset og

skjoldbruskkirtlen B er vokset, men i øvrigt er situationen som før.


Udvikling af skjoldbruskkirtlen



Her ses et endnu mere avanceret stadium. De organer, der udvikles fra branchialapparatet, sænker sig ned på den plads, de siden skal indtage.

Brisselen vil således senere vandre til den øverste del af brysthulen.


Organer der udvikles fra branchialapparatets indside



Træk endnu engang linien fra mundvig til ørespids af det ydre øre, og derfra til processus mastoideus og langs m. sternocleido-mastoideus til brystbenet.

Indenfor dette område ligger øregang, mellemøre, og det Eustachiske rør, endvidere tunge, mandler, skjoldbruskkirtel og biskjoldbruskkirtler (fortsættes).

Organer der udvikles fra branchialapparatets indside



Thymus (eller brisselen) **D**, har størstedelen i thorax, men en mindre del stikker dog op i halsen.

- A** trommehule og det Eustachiske rør.
- B** mandelen, tonsilla palatina.
- C-E** biskjoldbruskkirtler, livsvigtige småorganer.
- F** skjoldbruskkirtlen.
- D** brisselen.


Disse organer samt tungen, udvikles fra branchialapparatets indside.


Bueformede præg hos laverestående arter



Branchialapparatet hos laverestående dyr bevarer i højere grad det oprindelige bueformede præg end tilfældet er hos mennesket.


Nederste billedet viser branchialskelettet fra en fisk.






Tegningen viser kraniet og den øverste del af luftrøret **T** samt den nederste del af strubehovedet **C**.

Dele af strubehovedets skelet bliver udviklet fra branchialapparatet



Denne tegning viser strubehovedets skelet, tungebenet (3), (4), (5) og C, der ligeledes udvikles fra branchialapparatet.


Mandibula udvikles fra branchialapparatet



Her ser vi den største skeletdel, der udvikles fra branchialapparatet, nemlig underkæben. Hertil kommer de små øreknogler, (**1d**), (**2d**) og (**1c**), de stammer også fra branchialapparatet.


Det er derfor vigtigt ved afgrænsning af området fra mundvig til øre, at man går *til øvre spids* af øret, for at få dels mellemøre og dels øreknogler med.

i hver brankialbue bliver der udviklet..



- arterie og vene
- skeletdele
- tværstribet muskulatur
- nerve

Branchialbuer




Der er kar i alle branchialbue

Alle større vigtigere kar over hjertet
stammer fra branchial-apparatet

En nerve vokser ind i hver branchialbue

(fortsættes)

Branchialbuer




Endelig udvikles *muskler* i hver bue i branchialapparatet

Musklerne innerveres af den nerve der vokser ind i branchialbuen.

Som eksempel kan nævnes, at ansigtets bevægenerve, n. facialis, vokser ned i anden branchialbue, og så betyder det, at samtlige muskler, der innerveres af n. facialis, udvikles fra anden branchialbue.

1. branchialbue udvikler..



Brusk (Meckel)..

hammeren & armbolten (forbening)
raphe pterygomandibularis
(fibrolarisering)
mandibula (udenpå brusk)


Muskler - der hører til n. mandibularis!

de fire store tyggemuskler
m. tensor veli palatini
m. tensor tympani
m. mylohyoideus
venter anterior m. digastrici

Nerver

n mandibularis (V)

2. Branchialbue udvikler..



Brusk (Reichert's)..

stigbøjlen (forbening)

processus styloideus (forbening)

del af tungeben (forbening)

ligamentum stylohyoideum (fibrolarisering)

Muskler

m stapedius

ansigtsmusklerne

m platysma


venter posterior m. digastrici

m stylohyoideus

Nerver

n facialis (VII)

3. branchialbue




Brusk..
del af tungeben

Muskler
m stylopharyngeus

Nerver
n glossopharyngeus (IX)

4-5.6. branchialbue




Brusk..
thyroidea-brusk
larynx-brusk

Muskler
de fleste gænemuskler
pharynx-konstriktorer
larynxmuskler

Nerver
n vagus (X)

Branchialbuers nerver - oversigt



NERVER

n. mandibularis (1.bue)

n. facialis (2.bue)

n. glossopharyngeus
(3.bue)

n. vagus (4-6.bue)

NB

Nerverne vokser ned i branchialbuerne fra hjerneanlægget, og de bliver ikke dannet af væv i buerne.

Branchialbuers muskler - oversigt



NERVER

n. mandibularis (1.bue)

n. facialis (2.bue)

n. glossopharyngeus
(3.bue)

n. vagus (4-6.bue)

MUSKLER

tyggemusklér
ml.øre m fl..

ansigtsmuskler
m fl..


m stylopharyngeus

tværstribede
indvoldsmuskler:

- gane
- svælg
- strube
- oesophagus

(- tungemusklér)

tungens slimhinde



tungens slimhinde

nerver

•forreste 2/3

V, VII


•bageste 1/3

IX, X

tungens muskler
(kommer "udefra")

XII

Organer i 'trekantsområdet'




VISCERA

mellemøret (1.fure)
tunge (- muskler) (midten)
gl. thyroidea (midten)

tonsilla palatina (2.fure)


gll. parathyroidea (3-4.fure)
thymus (4.fure)

En indre og en ydre brankialfure når sammen og danner trommehinden



Arterier i området over hjertet

Arterier over hjertet udvikles fra branchialbuernes "aortabuer"



KAR

carotiderne
a. subclavia
tr. pulmonalis
arcus aortae

X

Brankialapparatet

Beskriv udvikling af brankialbuer mht :

- Udvikling af skeletdele

- Indvækst af nerver

- Udvikling af muskler

Join at menti.com | use code **7338 0531**



Brankialapparatet

